

اندیکاسیون های تجویز آسپرین در مادران باردار

پیشنهادات	ریسک فاکتور ها	میزان خطر
توصیه به مصرف دوز پایین آسپرین، اگر بیمار یک یا بیشتر از این ریسک فاکتور ها (High Risk) را دارد.	<ol style="list-style-type: none"> ۱. سابقه پره اکلامپسی به خصوص زمانی که با عوارض نامطلوب همراه است. ۲. بارداری چندقلویی ۳. فشار خون مزمن ۴. دیابت نوع یک یا دو ۵. بیماری کلیوی ۶. بیماری اتوایمیون (لوپوس، سندرم آنتی فسفولیپید) 	ریسک بالا
مصرف آسپرین با دوز پایین در صورت داشتن بیش از یک ریسک فاکتور متوسط مدنظر قرار گیرد.	<ol style="list-style-type: none"> ۱. نولی پار بودن ۲. چاقی ($BMI > 30$) ۳. سابقه خانوادگی پره اکلامپسی (مادر یا خواهر) ۴. نژاد افریقایی آمریکایی، وضعیت اجتماعی اقتصادی سطح پایین ۵. سن ≤ 35 ۶. سوابق و ریسک فاکتورهای فردی (سابقه نوزاد LBW و SGa، سابقه عوارض بارداری قبلی و فواصل بیش از ۱۰ سال بین بارداری ها) 	ریسک متوسط
آسپرین توصیه نمی شود.	بارداری ترم و بدون عارضه قبلی	ریسک پایین

- U.S Preventive Services Task Force Recommendation Statement Ann Intern 2014

مهرماه ۱۴۰۲



دکتر میترا افتخاری یزدی

مدیر گروه زنان