

فبرنامه ایمنی بیمار

تداخلات دارویی مرگبار

آمپول بیکربنات سدیم با آمپول دوپامین	آمپول بیکربنات سدیم با آمپول نفترین	آمپول بیکربنات سدیم با آمپول دوپونامین	آمپول بیکربنات سدیم با آمپول دوپامین
آمپول فنی توئین با سرم دکستروز	سرم رینگر با آمپول سفتریاکسون	کپسول آدالات با آمپول سولفات منیزیم	سرم رینگر با خون و فراورده های خونی

توجه: فاصله ی زمانی بین تزریق آمپول سفتریاکسون و سرم رینگر باید ۴۸ ساعت باشد و مابقی موارد نباید فقط بصورت همزمان تزریق شوند

برخی تداخلات دارویی مهم:

- سیلدنافیل با ایزوسورباید منونیترات
- الکل با استامینوفن
- آنتی بیوتیک ها با استروژن ها
- آنتی هیستامین ها با آرامبخش ها
- کینیدین با دیگوکسین
- هیدروکلرونیازید با لیتیوم
- دیگوکسین با وراپامیل و آمیودارون
- پتاسیم کلراید با اسپرونولاکتون، تریامترن، و سایر نگهدارنده های پتاسیم
- بتا بلوکر ها با انسولین
- اریتر و مایسین با کاربامازپین، سیزاپراید، سیلدنافیل، تئوفیلین
- سالیسیلات ها (آسپرین) با کورتیکو استروئید ها، هپارین، وارفارین، متوترکسات
- دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبوپروفن، ناپروکسن و ...) با ضد انعقاد ها (هپارین، و وارفارین و ...) کاپتوپریل، انالپریل،
- سایمتیدین با بنزودیازپین ها، لیدوکائین، پروپرانولول، کینیدین، تئوفیلین، و وارفارین
- وارفارین با آمیودارون، سایمتیدین، اریتر و مایسین، دی سولفیرام، فلوکونازول، لووستاتین، مترونیدازول، آسپرین، فنوباربتال، فنی توئین

مسئول ایمنی بیمار

تیر ۱۴۰۱